Lapisa®

Hecho en México por:
LAPISA, S.A. DE C.V.
Carr. La Piedad – Guadalajara km 5.5,
Col. Camelinas, C.P. 59375,
La Piedad, Michoacán, México.
www.lapisa.com

Lapitromicina®

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-211

RESPIRA, PRODUCE Y GANA

TULATROMICINA

Lapitromicina®

NÚMERO DE REGISTRO Q-2083-211

FÓRMULA:
Cada mL contiene:

Tulatromicina	**100 mg**
Vehículo c.b.p.	**1 mL**

INDICACIONES:
Antibiótico macrólido.
Lapitromicina está indicado para Porcinos: para el tratamiento del complejo respiratorio de ganado porcino (CRP) asociadas con *Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica y Haemophilus (Glaesserella) parasuis.*

DOSIS:
Porcinos: 1 mL por cada 40 kg de peso corporal (equivalente a 2.5 mg de Tulatromicina por kg de pesos corporal. Dosis única. No administrar más de 2.5 mL por sitio de aplicación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Porcinos: Intramuscular.

PERIODO DE RETIRO:
Porcinos: 5 días.

PRESENTACIONES:
Frasco de 100, 250 y 500 mL.

ADVERTENCIAS:
Producto para uso exclusivo en animales. No utilizar el producto en especies distintas a las mencionadas en la etiqueta. No administrar el producto en vacas productoras de leche para consumo humano.
Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, a una temperatura no mayor a 25 °C.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Una vez abierto, utilice el producto por no más de 30 días.
Los recipientes vacíos, así como cualquier contenido residual deben desecharse de acuerdo a la normatividad vigente / Eliminar los envases en el centro de acopio más cercano.

Lea el prospecto/instructivo anexo antes de utilizar el producto.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO **SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

CONTENIDO

¿QUÉ ES TULATROMICINA?

INDICACIONES

ASEGURAMIENTO DEL PROCESO DE APLICACIÓN

TU OPCIÓN

TABLA DE APLICACIÓN

¿QUÉ ES

TULATROMICINA?

La tulatromicina es un antibiótico macrólido triamilida semisintético de larga acción con propiedades bacteriostáticas ya que inhibe la síntesis proteica de las bacterias y por ende evita su reproducción.

INDICACIONES

Lapitromicina® esta indicado para el tratamiento del complejo respiratorio de ganado porcino (CRP) asociadas con *Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica y Haemophilus (Glaesserella) parasuis.*



DOSIS

Porcinos: 1 mL por cada 40 kg de peso corporal (equivalente a 2.5 mg de Tulatromicina por kg de peso corporal. Dosis única. No administrar más de 2.5 mL por sitio de aplicación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Porcinos: Intramuscular.

ASEGURAMIENTO DEL

2 | PROCESO DE APLICACIÓN:

- Almacenar el producto a temperatura ambiente y resguardarlo en un lugar seguro con el objetivo de evitar un uso indebido.
- Sujete al animal lo mejor posible antes de la aplicación de **Lapitromicina®**.
- Asegure que la aplicación y dosis se realice de forma correcta (intramuscular).
- Asegúrese de mantener los frascos y agujas utilizadas en un recipiente para desechos.

TEMPERATURA AMBIENTE



Almacenar el producto a temperatura ambiente y resguardarlo en un lugar seguro con el objetivo de evitar un uso indebido.

APLICACIÓN CORRECTA



Asegure que la aplicación y dosis se realice de forma correcta (Intramuscular).

RECIPIENTE DE DESECHO

Asegúrese de mantener los frascos y agujas utilizadas en un recipiente para desechos.

Lapitromicina®

¡ES TU OPCIÓN!

RESPIRA, PRODUCE Y GANA!!

- La tulatromicina ha mostrado una alta eficiencia al primer tratamiento.
- Se observa un incremento en el desempeño productivo del ganado debido a la diminución de problemas ocasionados por complejo respiratorio.
- Se minimiza la recaída en animales tratados y generación de crónicos.
- **Lapitromicina®** se concentra donde esta realmente el problema (tracto respiratorio).
- Fácil aplicación por un bajo volumen de dosificación y flexibilidad ya que su uso puede ser terapéutico o metafiláctico.

PERIODO DE RETIRO:

No utilizar para consumo humano la carne de animales tratados hasta 5 días posteriores al último tratamiento.

3

TABLA DE APLICACIÓN

Peso del animal	2.5 mg tulatromicina/kg p.c.
8 kg	0.2 mL
16 kg	0.4 mL
32 kg	0.8 mL
40 kg	1 mL
80 kg	2 mL
100 kg	2.5 mL
120 kg	3 mL

Recuerde **no aplicar más de 2.5 mL** en un mismo sitio.

BIBLIOGRAFÍAS

Comparative efficacy of metaphylaxis with tulatromycin and pentavalent modified-live virus vaccination in high-risk, newly received feedlot cattle. Veronica i. Muñoz, kendall l. Samuelson, pas, dexter j. Tomczak, pas, hannah a. Seiver, taylor m. Smock, pas, and john t. Richeson. West texas a&m university, canyon 79016. Anim. Sci. 36:799-807. 2020.

European medicines agency veterinary medicinal products (emea). Committee for veterinary medicinal products. Summary report-tulathromycin. 2004

European medicines agency veterinary medicinal products (emea). Committee for veterinary medicinal products. Summary report-tulathromycin. 2002.

J.E. Stegner, m.J. Lucas, c.L. Mclaughlin, m.S. Davis, g.R. Alanis, d.J. Weigel, j.H. Pollreisz, c.M. Tucker, w.C. Koers, o.A. Turgeon and j.I. Szasz. 2013. Comparative effects of therapeutic programs o bovine respiratory disease, performance, carcass and profitability of high-risk feedlot heifers. The professional animal scientist. 29:208-218.

Enrico fiore, leonardo armato, massimo morgante, michelle muraro, matteo boso, matteo gianesella. 2016. Methaphylactic effect of tulathromycin treatment on rumen fluid parameters in feedlot beef cattle. The canadian journal of veterinary research. 80: 60-65.

Lapisa, S.A. de C.V. Carr. La Piedad - Guadalajara km 5.5, Col. Camelinas, C.P. 59375, La Piedad, Michoacán, México. Tel. +52 (352) 5261300. www.lapisa.com.
LAPITROMICINA® (Tulatromicina), Número de Registro Q-2083-211. Consulte al Médico Veterinario. Su venta requiere receta médica.
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO